




НИИ гриппа
им. А.А. Смородинцева

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПНЕВМОВИРУСНЫМ (РСВ и МПВ) ИНФЕКЦИЯМ

за 40 неделю 2026 года. (28.09.26 - 04.10.26)


На 40 неделе 2026 года по данным еженедельного ПЦР-мониторинга из 32 городов (Астрахань, Белгород, Биробиджан, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Норильск, Омск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск, Самара, Симферополь, Смоленск, Санкт-Петербург НИИ Гриппа, Сыктывкар, Тула, Улан-Удэ, Ульяновск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск), расположенных в 7 Федеральных округах, ситуация по **респираторно-синцитиальному вирусу (РСВ) и метапневмовирусу (МПВ)** в России оставалась благополучной.

Рис. 1. Мониторинг респираторно-синцитиальной вирусной (РСВ) и метапневмовирусной (МПВ) инфекции у больных ОРВИ в городах России



В целом, по данным еженедельного ПЦР-мониторинга на 40 неделе 2026 года частота диагностирования РСВ составила **0,1%**. Частота диагностирования МПВ составила **0,07%**.


Рис. 2. Мониторинг респираторно-синцитиальной вирусной (РСВ) инфекции у больных ОРВИ отдельных возрастных групп в городах России



Мониторинг результатов ПЦР-диагностики РСВ инфекции в отдельных возрастных группах больных показал, что на 40 неделе 2026 года на РСВ обследован 5591 больной. Из них в возрастной группе 0-2 лет - 869, 3-6 лет - 709, 7-14 лет - 840, 15 лет и старше -


3173. Выявлено 7 (0,1%) случаев РСВ инфекции, в том числе 1 (0,1%) случай у детей в возрасте 0-2 года, 1 (0,1%) случай у дошкольников в возрасте 3-6 лет и 5 (0,2%) случаев у больных возрастной группы 15 лет и старше.

Рис.3. Мониторинг метапневмовирусной (МПВ) инфекции у больных ОРВИ отдельных возрастных групп в городах России



Мониторинг результатов ПЦР-диагностики МПВ инфекции в отдельных возрастных группах больных показал, что на 40 неделе 2026 года на МПВ обследован 5591 больной. Из них в возрастной группе 0-2 лет - 869, 3-6 лет - 709, 7-14 лет - 840, 15 лет и старше - 3173. Выявлено 4 (0,07%) случая МПВ инфекции, в том числе 2 (0,2%) случая у ребёнка в возрасте 0-2 года, 1 (0,1%) случай у школьников в возрасте 7-14 лет и 1 (0,03%) случай у больных возрастной группы 15 лет и старше.

Рис. 4. Суммарная частота диагностирования респираторно-синцициальной вирусной (РСВ) и метапневмовирусной (МПВ) инфекции в отдельных возрастных группах больных за период с 40 недели 2026 года по 40 неделю 2026 года



В целом, на 40 неделе 2026 года на РСВ и МПВ обследован 5591 больной в том числе 869 детей в возрасте 0-2 года, 709 дошкольников 3-6 лет, 840 школьников 7-14 лет и 3173 взрослых больных в возрасте 15 лет и старше.

РСВ, как причину ОРВИ, чаще регистрировали в возрастной группе 15 лет и старше. Суммарная частота диагностирования у детей в возрасте 0-2 года составила 0,1% от числа обследованных больных возрастной группы. У детей в возрасте 3-6 лет РСВ был выявлен в 0,1% случаев, у школьников 7-14 лет – в 0%. У взрослых больных возрастной группы 15 лет и старше РСВ был диагностирован у 0,2% больных.

МПВ, как причину ОРВИ, чаще регистрировали в возрастных группах детей 0-2 года. Суммарная частота диагностирования МПВ у детей в возрасте 0-2 года составила 0,2% от числа обследованных больных возрастной группы. У детей в возрасте 3-6 лет МПВ был выявлен в 0% случаев, у школьников 7-14 лет – в 0,1% случаев. У взрослых больных возрастной группы 15 лет и старше МПВ был диагностирован у 0,03% больных.